

REKOMMENDERADE VACCINATIONER OCH RÅDGIVNING

Resenärskategori	Tid: <3 veckor	Tid: 3 veckor - 3 mån	Tid: >3 mån
Resenär med enbart dagsutflykter på landsbygd, arbete i stadsmiljö	### gula febern* hepatit turistdiarré **** hälsoråd☒ malariainformation**	dessutom: hepatit B	dessutom: tyfoid BCG***
Flera resmål inom landet, också på landsbygd. Kringresande turist	### gula febern* hepatit A malariaprofylax** turistdiarré **** hälsoråd☒	dessutom: egenbehandling av diarré hepatit B	dessutom: tyfoid BCG***
Vistelse på extremt isolerad landsbygd	### gula febern* hepatit A turistdiarré **** egenbehandling av diarré malariaprofylax** hälsoråd☒	dessutom: hepatit B typhoid rabies	dessutom: BCG*** reseapotek
Arbete med sjukvård	### gula febern* hepatit A+B malariaprofylax** turistdiarré **** hälsoråd☒ BCG***	dessutom:	dessutom:

☒ Läs hälsoråden för resenärer till Syd- och Mellanamerika.

###Socialstyrelsen anser att alla invånare i Sverige bör skyddas mot stelkramp, difteri och polio. Din resa ökar inte risken nämnvärt, men passa gärna på att se över ditt vaccinationskydd, särskilt mot stelkramp så slipper du ta en dos om du skadar dig under resan.

* **Gula febern:** Vaccination krävs för resenärer som reser in från länder med risk för gula febern.

** **Malariarisk:** Mycket låg risk, så gott som enbart inom områden med immigranter från Guatemala. Myggstift och myggnät rekommenderas i riskområden.

*** Risken för resenärer att smittas av TBC är försumbar - ges i regel bara till dem som skall stationeras i landet.

****Vaccin mot kolera skyddar sannolik i 30-40 % mot turistdiarré men aktuella korrekt genomförda studier saknas.

Sjukvård: Acceptabel kvalitet.

