

REKOMMENDERADE VACCINATIONER OCH RÅDGIVNING

Resenärskategori	Tid: <3 veckor	Tid: 3 veckor - 3 mån	Tid: >3 mån
Resenär med enbart dagsutflykter på landsbygd, arbete i stadsmiljö	### hepatit A turistdiarré**** hälsoråd☒	dessutom: hepatit B	dessutom: japansk encefalit* BCG***
Flera resmål inom landet, också på landsbygd. Kringresande turist	### hepatit A malariainformation** turistdiarré**** hälsoråd☒	dessutom: japansk encefalit* hepatit B	dessutom: tyfoid BCG***
Vistelse på extremt isolerad landsbygd	### hepatit A malariainformation** turistdiarré**** egenbehandling av diarré hälsoråd☒	dessutom: tyfoid japansk encefalit* hepatit B	dessutom: BCG*** rabies
Arbete med sjukvård	### hepatit A+B malariainformation** turistdiarré**** hälsoråd☒ BCG***	dessutom: tyfoid	dessutom:

☒ Läs hälsoråden för resenärer till Sydostasien och Oceanien.

* **Japansk encefalit:** Så gott som enbart risk på landsbygd under sommartid (april-oktober).

** **Malariarisk:** Ingen eller synnerligen låg risk i så gott som hela Kina. Profylax med myggstift, myggnät rekommenderas resenärer som stannar flera veckor på landsbygd på ön Hainan utanför södra Kina eller i Wanding-området på gränsen till Yunnan.

*** Risken för resenärer att smittas av TBC är försumbar - ges i regel bara till dem som skall stationeras i landet.

****Vaccin mot kolera (Dukoral) minskar sannolikt risken för turistdiarré med 15 -30% men aktuella vetenskapligt korrekta studier saknas.

Sjukhusvård: Peking: Beijing United Family Hospital
Shanghai: Shanghai United family hospital

(Båda sjukhusen är dyra men har engelsktalande personal till en del).

Gula febern förekommer inte i Asien men vaccination krävs av inresande från länder där gula febern kan förekomma.

