

REKOMMENDERADE VACCINATIONER OCH RÅDGIVNING

Resenärskategori	Tid: <3 veckor	Tid: 3 veckor - 3 mån	Tid: >3 mån
Resenär med enbart dagsutflykter på landsbygd, arbete i stadsmiljö	### hepatit A turistdiarré* hälsoråd☒	dessutom: hepatit B	dessutom: tyfoid BCG**
Flera resmål inom landet, också på landsbygd. Kringresande turist	### hepatit A turistdiarré * hälsoråd☒ egenbehandling av diarré	dessutom: tyfoid hepatit B	dessutom: BCG**
Vistelse på extremt isolerad landsbygd	### hepatit A turistdiarré * egenbehandling av diarré hälsoråd☒	dessutom: tyfoid hepatit B	dessutom: BCG** rabies
Arbete med sjukvård	### hepatit A+B turistdiarré * hälsoråd☒ BCG**	dessutom: tyfoid	dessutom:

☒ Läs hälsoråden för resenärer till Främre Asien och Nordafrika.

Socialstyrelsen anser att alla invånare i Sverige bör skyddas mot stelkramp, difteri och polio. Din resa ökar inte risken nämnvärt, men passa gärna på att se över ditt vaccinationsskydd, särskilt mot stelkramp så slipper du ta en dos om du skadar dig under resan.

****Vaccin mot kolera (Dukoral) minskar sannolikt risken för turistdiarré med 30-40% men aktuella vetenskapligt korrekta studier saknas.

** Risken för resenärer att smittas av TBC är försumbar - ges i regel bara till dem som skall stationeras i landet.

Sjukvård: Varierande kvalitet.

Sjukhusvård: Svårt. Clinique Agdal, 6, Place Talbah, tel 770100 är sannolikt bra.

