

REKOMMENDERADE VACCINATIONER OCH RÅDGIVNING

Resenärskategori	Tid: <3 veckor	Tid: 3 veckor - 3 mån	Tid: >3 mån
Resenär med enbart dagsutflykter på landsbygd, arbete i stadsmiljö	### hepatit A mot turistdiarré ** hälsoråd☒	dessutom: tyfoid hepatit B	dessutom: BCG*
Flera resmål inom landet, också på landsbygd. Kringresande turist	### hepatit A turistdiarré ** hälsoråd☒ egenbehandling av diarré	dessutom: tyfoid hepatit B	dessutom: BCG*
Vistelse på extremt isolerad landsbygd	### hepatit A turistdiarré ** egenbehandling av diarré hälsoråd☒ reseapotek	dessutom: tyfoid meningokockvaccin hepatit B	dessutom: BCG* rabies
Arbete med sjukvård	### hepatit A+B turistdiarré ** hälsoråd☒ BCG*	dessutom: tyfoid	dessutom:

☒ Läs relevanta delar av hälsoråden för resenärer till Sydostasien och Oceanien.

Socialstyrelsen anser att alla invånare i Sverige bör skyddas mot stelkramp, difteri och polio. Din resa ökar inte risken nämnvärt, men passa gärna på att se över ditt vaccinationsskydd, särskilt mot stelkramp så slipper du ta en dos om du skadar dig under resan.

Läs avsnitt om höjdsjuka i hälsoråden.

Risken för resenärer att smittas av TBC är försumbar - ges i regel bara till dem som skall stationeras i landet.

****Vaccin mot kolera (Dukoral) minskar sannolikt risken för turistdiarré med 20-30% men aktuella vetenskapligt korrekta studier saknas.

Sjukvård: Okänd men förmodligen tveksam kvalitet.

