

REKOMMENDERADE VACCINATIONER OCH RÅDGIVNING

Resenärskategori	Tid: <3 veckor	Tid: 3 veckor - 3 mån	Tid: >3 mån
Resenär med enbart dagsutflykter på landsbygd, arbete i stadsmiljö	### gula febern* hepatit A hälsoråd☒ malariainformation** turistdiarré****	dessutom:	dessutom: tyfoid BCG*** hepatit B
Flera resmål inom landet, också på landsbygd. Kringresande turist	### gula febern* hepatit A malariaprofylax** hälsoråd☒ turistdiarré****	dessutom:	dessutom: tyfoid BCG*** hepatit B
Vistelse på extremt isolerad landsbygd	#### gula febern* hepatit A turistdiarré**** egenbehandling av diarré malariaprofylax** hälsoråd☒	dessutom:	dessutom: tyfoid BCG*** hepatit B
Arbete med sjukvård	### gula febern* hepatit A+B turistdiarré**** malariaprofylax** hälsoråd☒ BCG***	dessutom:	dessutom: tyfoid

☒ Läs hälsoråden för resenärer till Syd- och Mellanamerika.

Socialstyrelsen anser att alla invånare i Sverige bör skyddas mot stelkramp, difteri och polio. Din resa ökar inte risken för dessa sjukdomar nämnvärt, men passa gärna på att se över ditt vaccinationskydd, särskilt mot stelkramp så slipper du ta en dos om du skadar dig under resan.

* **Gula febern** vaccin krävs för inresande från länder med risk för gula febern och för resenärer som skall lämna Paraguay för resa till sådana länder. Sjukdomen kan dessutom riskeras längs gränsen mot Brasilien inklusive Iguazu falls (se särskild gula febernkarta).

** **Malariarisk:** Mycket låg risk, så gott som enbart för mindre allvarlig malaria under perioden oktober-maj på landsbygden i Alta Paraná och Caaguazu. I dessa områden rekommenderas myggstift och myggnät.

*** Risken för resenärer att smittas av TBC är försumbar - ges i regel bara till dem som skall stationeras i landet.

****Vaccin mot kolera (Dukoral) minskar sannolikt risken för turistdiarré med 20-30% men aktuella vetenskapligt korrekta studier saknas.

Sjukvård: Oftast acceptabel standard.

